МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ У БЕРЕМЕННЫХ

Руденко Н.Н.¹, Фокин А.В.¹, Машенко И.А.¹, Семенова Е.С.¹, Журавель А.В.², Новикова Е.В.³

¹ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, e-mail: mashchenko_ia@almazovcentre.ru;

²Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, e-mail: anka.zhuravel@yandex.ru;

³Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, e-mail: novikova elena96@mail.ru

Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) активно применяется в научно-исследовательской и в клинической практике, в том числе в обследовании беременных. Для проведения качественного диагностического МР-исследования во время беременности необходимы: высокопольный магнитно-резонансный томограф, градиентная система с высокой скоростью нарастания градиента магнитной индукции, быстрые импульсные последовательности, поверхностные принимающие абдоминальная или кардиальная катушки, специализированная пренатальная команда, состоящая из опытного врача-рентгенолога и рентгенолаборанта, понимание физических основ МРТ и особенностей программного обеспечения имеющегося томографа. Эти факторы расширяют возможности использования МРТ для клинических исследований у беременных женщин. Важными с практической точки зрения факторами, необходимыми для проведения качественного диагностического МР-исследования во время беременности, являются знание вопросов безопасности метода МРТ и рациональное планирование рабочего графика. Для качественного диагностического МР-исследования во время беременности следует придерживаться определенного алгоритма, состоящего из семи последовательных этапов: подготовки, плана исследования, позиционирования, получения изображений, получения ответа на поставленные вопросы, постпроцедурного периода и постобработки. Представленный научный обзор основан на анализе современных данных и личного опыта авторов применения методических принципов проведения МРТ во время беременности.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, беременность, патология плаценты, неакушерская патология, МРТ плода, аномалии плода, безопасность МРТ во время беременности.

METHODICAL BASES OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY IN PREGNANT WOMEN

Rudenko N.N.¹, Fokin. A.V.¹, Mashchenko I. A.¹, Semenova E.S.¹, Zhuravel A.V.², Novikova E.V.³

¹FSBI National Almazov Medical Research Center», St. Petersburg, e-mail: mashchenko_ia@almazovcentre.ru;

²North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, St. Petersburg, e-mail: anka.zhuravel@yandex.ru;

³First Pavlov State Medical University, Saint Petersburg, e-mail: novikova elena96@mail.ru

The method of magnetic resonance imaging (MRI) is actively used in research and in clinical practice, including in the examination of pregnant women. To conduct a high-quality diagnostic MR examination during pregnancy, you need: a high-field magnetic resonance scanner, a gradient system with a high slew rate of the magnetic induction gradient, fast pulse sequences, surface receiving abdominal or cardiac coils, a specialized prenatal team consisting of an experienced radiologist and X-ray laboratory assistant, understanding the physical basis of MRI and software features of an existing scanner]. These factors expand the use of MRI for clinical studies in pregnant women. It is important, from a practical point of view, factors necessary for conducting a high-quality diagnostic MR examination during pregnancy are knowledge of the safety of the MRI method and rational planning of the work schedule. For a high-quality diagnostic MR examination during pregnancy, one should adhere to a certain algorithm consisting of seven consecutive stages: preparation, research plan, positioning, obtaining images, obtaining answers to questions, post-procedural period and post-processing. The presented scientific review is based on the analysis of modern data and personal experience of the authors of the application of the methodological principles of MRI during pregnancy.

Keywords: magnetic resonance imaging, pregnancy, placental pathology, non-obstetric pathology, fetal MRI, fetal abnormalities, MRI safety during pregnancy.

В настоящее время МРТ во время беременности технически доступна в большинстве медицинских учреждений. Важными с практической точки зрения факторами, необходимыми для проведения качественного диагностического МР-исследования во время беременности, являются знание вопросов безопасности метода МРТ и рациональное планирование рабочего графика.

Цель исследования: формирование методического алгоритма и рекомендаций для проведения МРТ во время беременности.

Осведомленность в вопросах безопасности метода МРТ. Максимальная безопасность для беременных во время МР-исследования - основная задача современных разработчиков МР-аппаратуры, инженеров медицинского оборудования и врачей лучевой диагностики. В Российской Федерации с 2013 года действуют частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013 Часть 2-33, а в 2019 году дополнительно выпущены методические рекомендации № 63 по основам безопасности при проведении МРТ [1; 2]. К рискам от воздействия постоянного магнитного поля относят: смещение и превращение в «летающие объекты» любых ферромагнитных объектов; потенциальное воздействие постоянного магнитного поля. Проблему смещения и превращения в «летающие объекты» любых ферромагнитных объектов успешно решили путем разделения пространства кабинетов МРТ на 4 основные зоны, доступ к каждой из которых определяется строгим назначением и расстоянием от томографа, а также строгой процедурой контроля обслуживающего персонала и больных перед входом в отделение МРТ. Для пациентов необходима поэтапная проверка: сначала при заполнении анкеты и формы безопасности, а затем при собеседовании [3]. К рискам, возникающим во время переключения градиентных катушек МР-томографа, относят: индуцирование Е-поля в теле пациента при частоте от 100 до 2000 Гц; периферическую нервную стимуляцию; чрезмерный акустический шум. Это может ощущаться в виде легкого покалывания или постукивания при включении и выключении градиентов. Шум, который производится при этом, сильно различается и зависит от конструкции МРТ. В 2014 году американское управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов рекомендовала производителям устанавливать в МР-томографы программы, которые способствуют контролю скорости переключения градиента и поддержке значений дБ в допустимых диапазонах для обеспечения снижения акустического шума при МРТ. Также при МР-исследовании беременных женщин необходимо использовать дополнительные меры безопасности для снижения звука на плод - акустический

поролоновый матрас для стола МР-томографа; определение пиковых и среднеквадратичных уровней звукового шума для различных импульсных последовательностей, используемых при МРТ у беременных [4]. К рискам от воздействия радиочастотных полей относят термогенез - это проблема, которая требует решения и разработки медицинских руководств по безопасности, так как самые большие тепловые эффекты, скорее всего, связаны с факторами, не зависящими от самого тепла, генерируемого радиочастотными импульсами. Воздействия лекарственных средств, различных по форме и составу тканей одежды, влажности и температуры внешней среды на тепловые отклики тела пациента при воздействии РЧ-полей остаются до конца не изученными. Данные о термических повреждениях разнообразные, информация о границах между небольшими тепловыми воздействиями (без значимого патологического эффекта для здоровья) и очевидным ущербом – ограничены [5].

Учитывая возможный риск даже от умеренного радиочастотного, температурного и/или акустического воздействия на плод, в зависимости от технических характеристик МРТ, продолжительности МР-исследования и срока гестации, а также с учетом неизвестного долгосрочного влияния других факторов риска, врачам-рентгенологам в пренатальной МР-практике следует обоснованно соотносить возможные риски и предполагаемые преимущества при планировании МР-исследования у беременных на высокопольных томографах [6; 7].

Рациональное планирование рабочего графика. В настоящее время вся продолжительность МР-исследования у беременных пациенток не должна превышать 30 минут [8; 9]. При этом в зависимости от планируемой методики МР-исследования общее время пребывания в отделении МРТ может составлять от 30 до 60 минут с учетом всех особенностей исследования: МРТ плаценты – 45 минут, МР-фето- и пельвиметрия – 30 минут, МРТ головного мозга плода – 30 минут, МРТ плода при сочетанных врожденных пороках – 60 минут и т.д.

Для качественного диагностического МР-исследования во время беременности следует придерживаться определенного алгоритма, состоящего из семи основных последовательных этапов.

1. Подготовка к МР-исследованию беременной на любом сроке гестации всегда начинается с определения противопоказаний и показаний. В первую очередь следует исключить все возможные *абсолютные* (начавшаяся родовая деятельность, наличие инородных ферромагнитных тел, электронные водители ритма и др.) и *относительные* (первый триместр беременности, выраженный синдром сдавления нижней полой вены, выраженная клаустрофобия и др.) противопоказания к МР-исследованию [10].

Основными показаниями для МР-исследования во время любого срока беременности являются: все неотложные медицинские показания; все ситуации, когда нет возможности получить искомую информацию другими методами (например, УЗИ); случаи, когда результат МР-исследования может повлиять на тактику ведения беременности; случаи, когда проведение исследования в постнатальном периоде может оказаться несвоевременным [9; 11].

Основные показания для МР-исследования во II-III триметрах беременности разделяются на четыре основные категории: показания к выполнению МРТ плода при наличии сложностей, связанных с выполнением УЗИ [12], выявление признаков врожденных пороков и патологических состояний при УЗИ со стороны органов и систем плода [13; 14]; выявление МР-признаков патологии экстрафетальных структур; а также МР-фето- и пельвиметрии [15-17]; выявление МР-признаков неакушерской патологии у беременных (все подозрения на острые заболевания брюшной полости и малого таза; злокачественные новообразования и др.) [18-20].

Следующим этапом подготовки является оповещение беременной об ожидаемых результатах МРТ; ознакомление ее с информацией о безопасности метода; предупреждении ее о необходимости прекращения приема железосодержащих препаратов за 3-4 дня до МР-исследования из-за возможных артефактов от их наличия в кишечнике. Для уменьшения артефактов от перистальтики кишечника и «послеобеденных» движений плода рекомендуется не принимать пищу за 4 ч до исследования и опорожнить мочевой пузырь непосредственно перед процедурой [21].

2. План МР-исследования зависит от области исследования и поставленных лечащим врачом перед рентгенологом задач.

МР-исследование плода состоит из двух этапов. Первый - «материнский» - многоплоскостная визуализация, основанная на анатомии матери. Необходима для оценки расположения плода в полости матки и возможных сопутствующих патологических изменений у беременной женщины в области сканирования. Второй этап – этап исследования плода – решает поставленные лечащим врачом перед рентгенологом задачи.

Алгоритм МР-протокола для исследования плаценты трехэтапный. Состоит из «материнского», «плацентарного» и «тазового» этапов. «Материнский» - многоплоскостная визуализация, основанная на анатомии матери, основная цель которого – оценка сегментарного расположения плаценты в полости матки. «Плацентарный» – необходим для детального изучения паренхимы органа и оценки границы «плацента - миометрий» с получением изображений в трех ортогональных плоскостях относительно анатомии

плаценты. «Тазовый» – для оценки шейки матки и смежных структур малого таза, что крайне актуально при плацентарной адгезивно-инвазивной патологии.

3. Позиционирование и укладка беременной. Область исследования должна располагаться в изометрическом центре РЧ-катушки. Для этого необходимо всегда быть готовыми к коррекции положения катушки в процессе МРТ, особенно если это исследование плода, и он изменил свое первоначальное положение.

Основное положение беременной во время МР-исследования - лежа на спине либо головой, либо ногами вперед по направлению к туннелю магнита. Корпус тела располагается над встроенной в стол катушкой для позвоночника, а поверхностная РЧ-катушка для туловища устанавливается над животом и тазом. В нашей практике мы предпочитаем использовать комбинацию двух поверхностных РЧ-катушек с возможностью охвата ими живота беременной в виде полукольца (рис. 1). Для создания дополнительного комфорта для пациентки мы используем небольшую подушку под голову и специальный валик под колени.

Рис. 1. Комбинация РЧ-катушек (а) и расположение их в виде полукольца (б) для МР-исследования во время беременности

При ярко выраженном «синдроме нижней полой вены» мы рекомендуем использовать альтернативный вариант укладки - «лежа на левом боку». Однако при таком положении зона интереса может располагаться не в изометрическом центре МР-томографа и качество изображений может быть сниженным.

МР-изображения любой исследуемой области необходимо получать в трех ортогональных (аксиальной, коронарной и сагиттальной) плоскостях относительно анатомии зоны интереса, а если это МР-исследование плода, то МР-изображения следует получать минимум в двух последовательных сериях. При исследовании плода ориентация МР-изображений должна соответствовать положению плода, а не беременной.

4. Получение изображений. Для получения качественных диагностических МР-изображений необходимы: быстрые импульсные последовательности, возможность параллельного сбора данных, получение T1 и T2 ВИ без и с подавлением сигнала от жировой ткани (FS) в трех плоскостях [21]. МР-изображение должно иметь адекватное соотношение сигнал-шум, хорошее пространственное разрешение и формироваться за очень короткое время сканирования [21]. МР-изображения любой исследуемой области необходимо получать в трех ортогональных плоскостях относительно анатомии зоны интереса, а при МР-исследовании плода - минимум в двух последовательных сериях [22].

Основными «рабочими лошадками» в пренатальном МР-исследовании являются [23-25]:

SS-FSE (быстрое спин-эхо с однократным сбором данных) – характеризуется коротким временем сбора данных, является основной импульсной последовательностью (ИП) для визуализации исследуемых структур. Рекомендуется получение анатомических срезов зоны интереса в трех ортогональных плоскостях с толщиной «плодового» среза - 2-4 мм, а «поискового» и «материнского» - 5 мм. **B-SSFP** (сбалансированное градиентное эхо) – характеризуется очень коротким временем сбора данных, имеет хорошее разрешение, однако артефакты по периферии поля обзора могут затруднять диагностику. Рекомендуется получение анатомических срезов зоны интереса в трех ортогональных плоскостях с толщиной «плодового» среза этих ИП - от 2 до 4 мм; «поискового» и «материнского» - 4-5 мм. **Градиентное эхо T1** - для определения положения органов ЖКТ, особенно печени и петель кишечника при врожденных диафрагмальных грыжах, визуализации мекония в петлях кишечника. Кровоизлияния/белок/жир при этой ИП характеризуются ярким гиперинтенсивным сигналом. Рекомендуемая толщина среза 4 мм. Основной проблемой этой ИП являются выраженные артефакты от движения плода и дыхания матери. При их использовании рекомендуется проводить исследование с задержкой дыхания, а также устанавливать направление считывания сзади наперед (P-A), так как спина во время исследования – неподвижный объект. **Эхо-планарная ИП (EPI)** - субоптимальная ИП для диагностики, имеет высокую чувствительность к ишемическим изменениям и различным повреждениям головного мозга плода, используется для оценки опорно-двигательного аппарата плода. Рекомендуемая толщина среза 4-5 мм. Отрицательный момент – наличие выраженных артефактов и низкое разрешение изображений из-за неоднородности поля и химического сдвига, что ограничивает диагностическую ценность этой ИП. **Диффузионно-взвешенная MPT (DWI)** - используется для дифференциальной диагностики различных патологических состояний (нарушения кровообращения, объемных патологических состояний, воспалительных изменений и т.п.). **Кино MPT (SSFP)** - используется для оценки

глотания, оценки движений головы и туловища плода; оценки движений нижних конечностей плода; оценки сердца. **МР-гидрография** – высококонтрастные Т2-ВИ с акцентом на патологическое повышение или снижение количества жидкости. Рекомендуется получать изображения в 1-2 плоскостях, в соответствии с задачами исследования, с толщиной среза от 50 до 100 мм.

5. Получение ответа на поставленные вопросы. Наличие различных ИП и многоплоскостной визуализации дает возможность прямого отображения любых анатомических структур и дифференциальной диагностики патологических изменений с учетом характерных для них изменений интенсивности сигнала, что позволяет проводить полноценный анализ полученных данных с целью ответить на вопросы, поставленные клиническими специалистами перед МР-специалистами (рис. 2).

Рис. 2. МРТ плода, сагиттальная плоскость. Основные ИП, применяемые при МРТ во время беременности, с типичными характеристиками интенсивности сигнала от жидкости и мягких тканей

6. Постпроцедурный период. После окончания МР-исследования следует убедиться, что беременная пациентка хорошо себя чувствует и готова встать со стола-транспортера. Необходимо снять поверхностные РЧ-катушки с зоны исследования, помочь ей сначала присесть на несколько минут, а потом спуститься со стола. После этого следует провести ее в комнату ожидания и ответить на ее вопросы.

Если исследование проводилось в раннее утреннее время натошак, мы рекомендуем предложить беременной небольшой перекус в виде воды/сока/теплого чая с печеньем/сухофруктами и других, разрешенных для нее, продуктов, которые она может принести с собой.

7. Постобработка. Этот этап включает комплексный анализ данных анамнеза, имеющихся клинико-лабораторных данных, результатов УЗИ и полученных данных во время

МР-исследования, результатом которого является составление заключения с ответами на поставленные задачи и описанием выявленных изменений.

Заключение. Магнитно-резонансная томография является относительно безопасным методом лучевой диагностики и соответствует основным требованиям, которые предъявляются методам пренатальной диагностики с такими неоспоримыми достоинствами, как возможность: прямого отображения всех анатомических структур в исследуемой зоне интереса с хорошим межтканевым контрастом; получения МР-изображений в любой необходимой плоскости; специфической характеристики изменений интенсивности МР-сигнала благодаря применению различных ИП.

Магнитно-резонансное исследование беременных – это эффективная работа специализированной пренатальной команды, члены которой могут выполнить любое назначенное МР-исследование; знают, когда МР-исследование необходимо начинать и как его следует продолжить; они умеют позиционировать следующий этап МР-исследования и оценивать полученные МР-изображения.

Список литературы

1. ГОСТ Р МЭК 60601-2-33-2013. Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса. М.: Стандартинформ, 2016. 153 с.
2. Сергунова К.А., Ахмад Е.С., Петряйкин А.В., Семенов Д.С., Васильев Ю.А., Кивасёв С.А., Владзимирский А.В., Морозов С.П. Основы безопасности при проведении магнитно-резонансной томографии. Методические рекомендации №63. М.: Серия «Лучшие практики лучевой и инструментальной диагностики», 2019. Вып. 47. 68 с.
3. Crisp S., Dawdy K. Building a Magnetic Resonance Imaging Safety Culture from the Ground Up. Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences. 2018. V.49. no.1. P. 18–22. DOI:10.1016/j.jmir.2017.10.005.
4. FDA. Safety Guidelines for Magnetic Resonance Imaging Equipment in Clinical Use. 2014. [Электронный ресурс]. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/476931/MRI_guidance_2015_-_4-02d1.pdf (дата обращения: 15.05.2020).
5. Edwards M.J., Saunders R.D., Shiota K. Effects of heat on embryos and fetuses. Int. J. Hyperthermia. 2003. V.19. no.3. P. 295-324.

6. ACR. Manual on Contrast Media, Version 10.2. 2016; December 9, 2016. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.acr.org/quality-safety/resources/contrast-manual>. (дата обращения: 15.05.2020).
7. Chen M.M., Coakley F.V., Kaimal A., Laros R.K. Jr. Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation. *Obstet Gynecol.* 2008. V.112. no.2. P.333–340. DOI: 10.1097/AOG.0b013e318180a505.
8. Victoria T., Johnson A., Edgar J., Zarnow D., Vossough A. Comparison Between 1.5-T and 3-T MRI for Fetal Imaging: Is There an Advantage to Imaging With a Higher Field Strength? *American Journal of Roentgenology.* 2016. V.206. no.1. P. 195-201. DOI: 10.2214/AJR.14.14205.
9. Mervak B. M., Altun E., McGinty K. A., Hyslop W. B., Semelka R. C., Burke L. M. MRI in pregnancy: Indications and practical considerations. *Journal of Magnetic Resonance Imaging.* 2019. no.49. P. 621-631. DOI:10.1002/jmri.26317.
10. Dill T. Contraindications to magnetic resonance imaging. *Heart.* 2008. V. 94. no.7. P. 943–948. DOI:10.1136/hrt.2007.125039.
11. Santos X.M., Papanna R., Johnson A., Cass D.L., Olutoye O.O., Moise K.J. Jr. The use of combined ultrasound and magnetic resonance imaging in the detection of fetal anomalies. *Prenat. Diagn.* 2010. V.30. no.5. P.402–407. DOI: 10.1002/pd.2481.
12. Griffiths P. D., Mooney C., Bradburn M., Jarvis D. Should we perform in utero MRI on a fetus at increased risk of a brain abnormality if ultrasonography is normal or shows non-specific findings? *Clinical Radiology.* 2018. V.73. no.2. P. 123–134. DOI:10.1016/j.crad.2017.09.007.
13. Коростышевская А.М., Савелов А.А. Роль магнитно-резонансной томографии плода в диагностике врожденных пороков развития // Бюллетень сибирской медицины. 2012. Т.11. №5. С.128-131. DOI: 10.20538/1682-0363-2012-5-128-131.
14. Furey E.A., Bailey A.A., Twickler D.M. Fetal MR Imaging of Gastrointestinal Abnormalities. *RadioGraphics.* 2016. V.36. no.3.P. 904–917 DOI: 10.1148/rg.2016150109.
15. D'Antonio F., Iacovella C., Palacios-Jaraquemada J. Prenatal identification of invasive placentation using magnetic resonance imaging: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2014. V.44. no.1. P.8–16 DOI: 10.1002/uog.13327.
16. Moshiri M., Zaidi S. F., Robinson T. J., Bhargava P., Siebert J. R., Dubinsky T. J., Katz, D. S. Comprehensive Imaging Review of Abnormalities of the Umbilical Cord. *RadioGraphics.* 2014. V.34. no.1. P. 179–196. DOI:10.1148/rg.341125127.
17. Шмедык Н.Ю., Труфанов Г.Е., Фокин В.А., Ефимцев А.Ю., Козловский С.Н. Магнитно-резонансная и наружная пельвиметрия в диагностике формы и степени суженного таза у беременных // Трансляционная медицина. 2016. Т.3. №5. С.113-124. DOI: 10.18705/2311-4495-2016-3-5-113-124.

18. Ahluwalia A., Moshiri M., Baheti A., Saboo S., Bhargava P., Katz D.S. MRI of Acute Abdominal and Pelvic Non-obstetric Conditions in Pregnancy. *Current Radiology Reports*. 2018. V.6. no.8. DOI: 10.1007/s40134-018-0285-5.
19. Steinkeler J.A., Lee K.S. MRI in pregnancy: Gastrointestinal and genitourinary pathology. *Appl. Radiol.* 2017. V.46. no.5. P. 23-28.
20. Woitek R., Prayer D., Hojreh A., Helbich T. Radiological staging in pregnant patients with cancer. *ESMO Open*. 2016. V.1. no.1. URL: <https://esmoopen.bmj.com/content/1/1/e000017> doi:10.1136/esmoopen-2015-000017 (дата обращения: 15.05.2020).
21. Saleem S.N. Fetal MRI: An approach to practice: A review. *J. Adv. Res.* 2014.V. 5. P. 507–523. DOI: 10.1016/j.jare.2013.06.001.
22. American College of Radiology. Fetal MRI. PRACTICE GUIDELINE. ACR–SPR PRACTICE PARAMETER FOR THE SAFE AND OPTIMAL PERFORMANCE OF FETAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING (MRI) (Resolution 11). 2015.URL: <https://www.acr.org/-/media/ACR/Files/Practice-Parameters/mr-fetal.pdf> (дата обращения: 15.05.2020).
23. Huang H., Vasung L. Gaining insight of fetal brain development with diffusion MRI and histology. *Int. J. Dev. Neurosci.* 2014. V.32. P.11-22. DOI: 10.1016/j.ijdevneu.2013.06.005.
24. Valevičienė N., Varytė G., Zakarevičienė J., Kontrimavičiūtė E., Ramašauskaitė D., Rutkauskaitė-Valančienė D. Use of Magnetic Resonance Imaging in Evaluating Fetal Brain and Abdomen Malformations during Pregnancy. *Medicina*. 2019. V.55. no.2 URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6410250>. DOI:10.3390/medicina55020055.
25. Asenbaum U., Brugger P.C., Woitek R., Furtner J., Prayer D. Indications and technique of fetal magnetic resonance imaging. *Radiologe*. 2013.V. 53. no.2. P.109 – 115. DOI: 10.1007/s00117-012-2397-x.